

# 御前崎に「隆起貝層」

## 14世紀東海地震起因

南海トラフで過去に発生した地震で出現したとされる県内唯一の「隆起貝層」を、御前崎市の海岸の岩礁帯で確認したとする調査結果を、静岡大の北村晃寿教授(古環境学)がまとめた。千葉市で開かれている日本地球惑星科学連合大会で22日、発表する。



海岸の岩礁帯で確認された南海トラフの地震による  
隆起貝層=御前崎市(北村教授提供)



北村教授によると、  
御前崎の隆起貝層は1  
943年、元東大教授  
で地震学者の故今村明  
(北村教授提供)

Q 隆起貝層か  
つて貝類が生息  
していた海中の岩場  
が、地震などに伴い海  
面より高い場所に隆起  
したもの。主に貝の殻  
が化石として残る。化  
石の放射性炭素年代測  
定や貝層の海面からの  
高さなどから、隆起が  
発生した時代などを推  
定できる。

隆起貝層から見つかった力  
モメガイの化石(北村教授  
提供)

(社会部・松岡雷太)

恒氏が論文で存在を指  
摘していた。ただ、写  
真や位置図などが記さ  
れず、これまで未確認

づて貝類が生息  
していた海中の岩場  
が、地震などに伴い海  
面より高い場所に隆起  
したもの。主に貝の殻  
が化石として残る。化  
石の放射性炭素年代測  
定や貝層の海面からの  
高さなどから、隆起が  
発生した時代などを推  
定できる。

隆起貝層が露出した可  
能性もあるという。

北村教授は放射性炭  
素法から、化石の年代  
を1270~1500年前後と測定。別の研  
究者による地殻変動の  
調査などから、貝層隆  
起は1361年に発生  
した正平(康安)東海  
地震と断層活動による

のままだった。  
確認された隆起貝層  
は海岸線に広がる岩礁  
の一部で幅約20m、奥  
行き約6mの泥岩。表

面からは、海中より隆  
起する以前に生息して  
いた穿孔(せんこう)  
貝の一種・カモメガイ  
の化石が多数見つかっ  
た。海岸の砂浜が近年  
減少したことにより、  
隆起貝層が露出した可  
能性もあるという。

北村教授は「保存状  
態がよく、一目で隆起  
したことが分かる貴重  
な証拠。防災教材とし  
ても保護が必要があ  
る」と話している。  
ものと推定した。御前  
崎で当時、局地的な海  
岸隆起があったとする  
これまでの学説を裏付  
けた。



北村教授は「保存状  
態がよく、一目で隆起  
したことが分かる貴重  
な証拠。防災教材とし  
ても保護が必要があ  
る」と話している。